

Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie zusätzliche Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter.

KLINIK FÜR KARDIOLOGIE

CHEFARZT

Dr. med. Henning Meinhold

E-Mail: h.meinhold@krankenhaus-prignitz.de

LTD. OBERARZT HERZKATHETERLABOR

Dr. med. Hilmar Kleinau

E-Mail: h.kleinau@krankenhaus-prignitz.de

SEKRETARIAT

Jana Klemkow

Telefon: 03876 30-3561

Telefax: 03876 30-3563

NACH DER HERZKATHETERUNTERSUCHUNG

Informationen für den Patienten



Design und Druck: clever+SMOIL
Fotos: Suse Beck

KREISKRANKENHAUS

PRIGNITZ GEMEINNÜTZIGE GMBH

Dobberziner Straße 112

Telefon: 03876 30-30

19348 Perleberg

Telefax: 03876 30-3013

www.krankenhaus-prignitz.de

KLINIK FÜR KARDIOLOGIE

Kreiskrankenhaus Prignitz

ALLGEMEINE HINWEISE

Bitte organisieren Sie die Heimfahrt mit Angehörigen oder Freunden, da Sie nicht selbst Auto fahren sollten.

Im Einzelfall werden Taxifahrten von der Krankenkasse ersetzt (10 % der Kosten müssen zugezahlt werden; mind. 5 €, max. 10 €).

Bei Auffälligkeiten im Bereich der Punktionsstelle, wie z. B.

- Blutung,
- plötzliche Schmerzen,
- Schwellungen, Rötungen und/oder Überwärmung,
- Taubheitsgefühl,

bitten wir Sie, sich umgehend in unserer Notaufnahme vorzustellen.

MEDIKAMENTENEINNAHME

Bitte beachten Sie **unbedingt** unsere Empfehlungen zur Medikamenteneinnahme. Dies gilt insbesondere für folgende Medikamente:

- **Clopidogrel (Plavix^(R), Iscover^(R))**
- **ASS**
- **Prasugrel (Efient^(R))**
- **Ticagrelor (Brilique^(R))**

Dosis und Dauer sind zwingend einzuhalten. Bei vorzeitigem Pausieren bitte Rücksprache halten. Ein Absetzen dieser Medikamente kann zu schweren unerwünschten Ereignissen, z. B. Stentverschluss führen.

HERZKATHETERUNTERSUCHUNG ÜBER DIE LEISTE

Bitte vermeiden Sie für ca. 10 Tage nach der Untersuchung stärkere körperliche Anstrengungen wie beispielsweise:

- Fahrradfahren
- Tragen von Gewichten (Einkaufstaschen, Kisten oder ähnliches)
- langes Sitzen im Auto oder im Flugzeug
- Gartenarbeit
- Verzicht auf ein Vollbad

HERZKATHETERUNTERSUCHUNG ÜBER DEN ARM

Bitte vermeiden Sie für ca. 10 Tage nach der Untersuchung stärkere Armbelastungen wie beispielsweise:

- Tragen von Gewichten (Einkaufstaschen, Kisten oder ähnliches)
- Gartenarbeit
- Hausarbeit (Wischen, Fensterputzen)
- Verzicht von längerem Kontakt mit Wasser